

□□ Раннее выявление туберкулеза

Знаете ли Вы, что на сегодняшний день около 25% населения планеты инфицированы туберкулезом? НО! Это не означает, что эти люди больны им. Просто благодаря высокой сопротивляемости организма микобактерии у них не вызывают заболевание – эти люди

не болеют сами и не могут заразить других. Тем не менее существует 5-15% вероятности того, что у инфицированного человека в течение жизни разовьется активный туберкулезный процесс.

Кто подвергается наибольшему риску? Вероятность инфицирования и развития заболевания повышается при воздействии таких факторов, как ослабление иммунитета, недоедание, плохие условия жизни, бедность или вынужденное переселение.

В самом начале заболевания туберкулезом выраженные клинические проявления отсутствуют, поэтому заподозрить и обнаружить болезнь непросто. Это не только может привести к позднему обращению за медицинской помощью, но и увеличить риск заражения других людей. Известно ли вам, что за один год человек с активной формой туберкулеза легких может инфицировать от 5 до 15 человек, с которыми он часто общается?!

Что делать, чтобы вовремя распознать туберкулез? Необходимо внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачам для консультации

и обследования.

Основные симптомы, при которых Вы можете заподозрить туберкулез:

кашель на протяжении двух и более недель, преимущественно

по утрам и ночью (сначала кашель не сильный, сухой, но со временем начинает прогрессировать: при кашле начинает выделяться мокрота,

а при дальнейшем прогрессировании болезни может появляться кровохаркание)

повышение температуры до 37-38° С, температура держится продолжительное время и нарастает в вечерние часы

Другие симптомы, которые наблюдаются при туберкулезе:

недомогание, слабость, постоянная усталость

снижение веса без видимых причин

усиленное потоотделение (особенно в ночное время)

боль в грудной клетке, которая может усиливаться при кашле

и глубоким вдохе

Обратите внимание, если Вы обнаружили у себя сразу два основных симптома или один из основных симптомов как минимум два дополнительных – немедленно обращайтесь за медицинской помощью для обследования и установки диагноза!

Раннее выявление туберкулеза является одним из наиболее важных определяющих факторов благоприятного исхода лечения.

Помните, туберкулез излечим, а если Вы вовремя обратитесь за медицинской помощью при первых признаках заболевания, и будете следовать всем рекомендациям врачей, то лечение будет более эффективным и менее длительным.

[Раннее](#) выявление туберкулеза

Знаете ли Вы, что на сегодняшний день около 25% населения планеты инфицированы туберкулезом? НО! Это не означает, что эти люди больны им. Просто благодаря высокой сопротивляемости организма микобактерии у них не вызывают заболевание – эти люди не болеют сами и не могут заразить других. Тем не менее существует 5-15% вероятности того, что у инфицированного человека в течение жизни разовьется активный туберкулезный процесс.

Кто подвергается наибольшему риску? Вероятность инфицирования и развития заболевания повышается при воздействии таких факторов, как ослабление иммунитета, недоедание, плохие условия жизни, бедность или вынужденное переселение.

В самом начале заболевания туберкулезом выраженные клинические проявления отсутствуют, поэтому заподозрить и обнаружить болезнь непросто. Это не только может привести к позднему обращению за медицинской помощью, но и увеличить риск заражения других людей. Известно ли вам, что за один год человек с активной формой туберкулеза легких может инфицировать от 5 до 15 человек, с которыми он часто общается?!

Что делать, чтобы вовремя распознать туберкулез? Необходимо внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачам для консультации и обследования.

Основные симптомы, при которых Вы можете заподозрить туберкулез:

кашель на протяжении двух и более недель, преимущественно по утрам и ночью (сначала кашель не сильный, сухой, но со временем начинает прогрессировать: при кашле начинает выделяться мокрота, а при дальнейшем прогрессировании болезни может появляться кровохаркание) повышение температуры до 37-38° С, температура держится продолжительное время и нарастает в вечерние часы

Другие симптомы, которые наблюдаются при туберкулезе:

недомогание, слабость, постоянная усталость
снижение веса без видимых причин
усиленное потоотделение (особенно в ночное время)
боль в грудной клетке, которая может усиливаться при кашле и глубоком вдохе

Обратите внимание, если Вы обнаружили у себя сразу два основных симптома или один из основных симптомов как минимум два дополнительных – немедленно обращайтесь за медицинской помощью для обследования и установки диагноза!

Раннее выявление туберкулеза является одним из наиболее важных определяющих факторов благоприятного исхода лечения.

Помните, туберкулез излечим, а если Вы вовремя обратитесь за медицинской помощью при первых признаках заболевания, и будете следовать всем рекомендациям врачей, то лечение будет более эффективным и менее длительным.